

Curacid® HD-sept – Hände- und Hautdesinfektion

2-Propanol 70% (V/V)

Hautverträgliches, alkoholisches, parfümfreies Desinfektionsmittel zum Einreiben in die Haut und Hände. **Curacid® HD-sept** ist aldehyd-, phenol- und QAV-frei und damit frei von hautschädigenden Langzeitwirkstoffen. Daher dermatologisch empfohlen für Desinfektion bei allergieempfindlichen Personen.

Arzneilich wirksame Bestandteile in 100ml:

63,1 g 2-Propanol

sonstiger Bestandteil: gereinigtes Wasser

Anwendungsgebiete

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion, Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talkdrüsenreicher Haut, Kühlumschläge.

Wirkungsspektrum

- bakterizid inkl. TBC und MRSA
- fungizid
- virusinaktivierend inkl. HIV/HBV, BVDV, HCV, Rotaviren, Vacciniaviren

Gegenanzeigen

Curacid® HD-sept ist nicht zur Desinfektion offener Wunden anzuwenden.

Nebenwirkungen

Beim Einreiben der Haut mit **Curacid® HD-sept** können Rötungen und leichtes Brennen auftreten.

Warnhinweise

Leicht entzündlich! Von Zündquellen fernhalten! Dicht verschlossen lagern. Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z.B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und

das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen.

Dosierung und Anwendung

Zur hygienischen Händedesinfektion werden die Hände mit der Lösung eingerieben und 30 Sekunden lang feucht gehalten. Zur chirurgischen Händedesinfektion werden Hände und Unterarme mit der Lösung eingerieben und 5 Minuten lang feucht gehalten.

Zur Desinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 15 Sekunden lang feucht gehalten.

Zur Desinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 1 Minute lang feucht gehalten.

Zur Desinfektion von talgdrüsenreicher Haut wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 10 Minuten lang feucht gehalten.

Für Kühlumschläge ist die Lösung mit gleichen Teilen Wasser verdünnt anzuwenden.

Hinweise: Die Zeitangaben sind Mindestzeiten. Je nach zusätzlichen Erfordernissen (z.B. feuchte Haut, Verschmutzung der Haut, Risiko des Eingriffs) sind die Einwirkzeiten zu verlängern. **Curacid® HD-sept** wirkt nicht sporenabtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen nicht geeignet.

RKI gelistet nach §18 IfSG

Zugelassenes Arzneimittel

Zul.-Nr.: 1599.98.99

Lieferformen

Art.-Nr.: 10251 500 ml Flasche

Art.-Nr.: 10252 1000 ml Flasche

Art.-Nr.: 10253 5 Liter Kanister