

Verfahrensweisung bei:

Norovirus-Infektionen (Norwalk-like)

Erreger:	Caliciviren, Noroviren Die Erkrankungen (Gastroenteritiden) treten als nosokomiale Infektionen in Krankenhäusern so wie Alten- und Pflegeheimen auf.
Erregerhaltiges Material:	Stuhl, Erbrochenes, Lebensmittel, Trinkwasser
Meldepflicht:	Nach § 7 Infektionsschutzgesetz nur für den direkten Nachweis aus Stuhl.
Dauer der nachstehenden Schutzmaßnahmen:	Dauer der Erkrankung
Räumliche Unterbringung:	Einzelunterbringung erforderlich, Kohortenisolierung möglich.
<u>Persönlicher Schutz:</u>	
Schutzkittel:	Einzelunterbringung bei möglichem Kontakt mit erregerhaltigem Material, mit kontaminierten Objekten oder mit erkrankten Personen.
Handschuhe:	Erforderlich bei möglichem Kontakt mit erregerhaltigem Material oder mit kontaminierten Objekten.
Mund-/Nasenschutz:	Erforderlich, da Übertragbarkeit durch Aerosole möglich.
Schuhe:	Wechsel der Schuhe nicht erforderlich.
Desinfektion und Reinigung:	Wirkungsbereich der Desinfektionsmittel und - Verfahren: B
Hygienische Händedesinfektion:	Erforderlich nach direktem Kontakt mit dem Patienten, mit erregerhaltigem Material oder mit kontaminierten Objekten, auch nach Ablegen der Handschuhe. Curacid Noro-sept unverdünnt 30 Sekunden

Verfahrensanweisung bei:

Norovirus-Infektionen (Norwalk-like)

Flächendesinfektion:	<p>Eine routinemäßige Desinfektion ist für patientennahe Flächen erforderlich, sie ist bei Bedarf auf weitere Flächen auszudehnen. Es sind Mittel, die auch in der Liste des RKI verzeichnet sind, einzusetzen. Eine Viruswirksamkeit ist erforderlich.</p> <p>Bei sichtbarer Kontamination sind die Mittel des RKI mit dem dort angegebenen Konzentrationen und Einwirkzeiten zu verwenden.</p> <p>Curacid® DR 10 2% 120 Minuten oder Curacid® Aktiv unverdünnt 15 Minuten</p>
Instrumentendesinfektion:	<p>Erforderlich; bei zentraler Desinfektion Transport in geschlossenen Behälter; wenn möglich thermisches Desinfektionsverfahren anwenden.</p>
Geschirr:	<p>Durch geeignete Desinfektions- und Reinigungsautomaten muss sichergestellt werden, dass vom Geschirr keine Infektionsgefahr mehr ausgeht; zentrale Desinfektion bei entsprechendem Transport.</p>
Wäsche:	<p>Desinfektion der mit erregerehaltigem Material kontaminierten Wäsche mit Mitteln und Verfahren der Liste des RKI; zentrale Desinfektion bei entsprechendem Transport verschlossen und gekennzeichnet.</p>
Textilien:	<p>Desinfektion der mit erregerehaltigem Material kontaminierten Textilien mit Mitteln und Verfahren der Liste des RKI; zentrale Desinfektion bei entsprechendem Transport.</p>
Schlussdesinfektion:	<p>Es sind Maßnahmen entsprechend den Angaben zur laufenden Desinfektion anzuwenden.</p> <p>Matratzen, Kissen und Decken sind mit Mitteln und Verfahren der Liste des RKI zu desinfizieren.</p>
Entsorgung:	<p>Erregerehaltiges Material und Abfälle, die mit erregerehaltigem Material kontaminiert sein können, sind als Abfall der Gruppe B zu entsorgen; Fäzes können undesinfiziert der Kanalisation zugeführt werden.</p>
Weitere Informationen:	<p>PICO-Medical GmbH, http://www.picomedical.de Curacid Noro-sept, http://www.noro-sept.de</p>