

Curacid® Poly – Händedesinfektion mit Rückfettern

Curacid® Poly ist eine gebrauchsfertige alkoholische Lösung für die hygienische Händedesinfektion. **Curacid® Poly** ist ausgestattet mit hochwertigen Rückfetttern, die auch bei häufiger Anwendung eine hervorragende Hautverträglichkeit gewährleisten.

Wirksame Bestandteile in 100ml:

Propan-2-ol 70ml

sonstige Bestandteile: 1,3-Butandiol, gereinigtes Wasser, Lanolin-poly(oxyethylen), Parfümöl

Anwendungsgebiete

Hygienische Händedesinfektion. Geeignet für alle Bereiche zur menschlichen Hygiene mit hohen Anforderungen an die Händehygiene in Kliniken, Praxen, Pflegeeinrichtungen sowie in Industrie und Labor.

Wirkungsspektrum

- bakterizid inkl. TB und MRSA
- fungizid
- tuberkulozid
- viruzid gegen behüllte Viren wie z. Bsp. HIV/HBV/HCV, BVDV, Influenza
- gegen Vacciniaviren, Adenoviren und Noroviren
- RKI, Wirkungsbereich A

Warnhinweise

Leicht entzündlich! Von Zündquellen fernhalten! Dicht verschlossen lagern. Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z.B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen.

Dosierung und Anwendung

Zur hygienischen Händedesinfektion werden 3 ml in die hohle Handfläche gegeben und sofort mind. 30 Sekunden intensiv mit beiden Händen so verreiben, dass die Hände vollständig benetzt werden. Es ist zu beachten, dass immer auch alle Fingerzwischenräume, Fingernagelfalze und Hautfalten vollständig und über die gesamte

Einwirkzeit benetzt werden. Nach Ablauf der Einwirkzeit ist die Desinfektion abgeschlossen.

Hinweise: Die Zeitangaben sind Mindestzeiten. Je nach zusätzlichen Erfordernissen (z.B. feuchte Haut, Verschmutzung der Haut, Risiko des Eingriffs) sind die Einwirkzeiten zu verlängern.

Einwirkzeiten

Hygien. Händedesinfektion	
gem. VAH	30 Sekunden
RKI (Wirkungsbereich A)	30 Sekunden
RKI (begrenzt viruzid)	30 Sekunden
BVDV	30 Sekunden
Vaccinia	30 Sekunden
Adenoviren	2 Minuten
Noro	30 Sekunden
Rota	30 Sekunden
MRSA	30 Sekunden
TB	60 Sekunden

Vermeidung von Anwendungsfehlern

Stark verschmutzte Hände sollten vor der Desinfektion mit Wasser und Seife gereinigt werden. Nasse Hände vor der Desinfektion erst trocknen lassen. **Curacid® Poly** ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet.

Lieferformen

Art.-Nr.: 10210	100 ml Flasche
Art.-Nr.: 10211	500 ml Flasche
Art.-Nr.: 10212	1000 ml Flasche
Art.-Nr.: 10213	5 Liter Kanister

